



PLAN FITOSANITARIO

Manejo integrado del pasto Kikuyo

Producido por:



Ideas Biológicas
Por un futuro sostenible

www.ideasbiologicas.com
Email: asesoria@ideasbiologicas.com



/IdeasBiologicas



@IdeasBiologicas



ib.ideasbiologicas




310 602 6281
310 601 1327



Control de plagas y enfermedades

MANEJO INTEGRADO EN EL PASTO KIKUYO

PLAGA O ENFERMEDAD	PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
 Chinche de los pastos.	 BIOVERIA. (Beauveria bassiana)	 50 g/bomba de 20 litros.	 Aplicarlo después del pastoreo y repetirlo a los 15 días.
 Gusano ejército, Salivazo Cucarrón marceño.	 BIONEEM. (Extracto de neem)	 60 cc/bomba de 20 l.	 Realizar tres aplicaciones durante el tiempo de descanso del potrero. Comenzando desde el pastoreo.
 Chizas, lorito verde	 BIORHIZIUM. (Metarhizium)	 50 gr/bomba de 20 l.	 Aplicarlo en la época de llegada de cucarrón marceño. Aplicar al suelo.





Principales plagas pasto kikuyo (*Penicetum clandestinum*)

1. Chince de los pastos (*Collaria scenica*).



2. Salivazo (*Aneolamia varia* o *Zulia carbonara*).



3. Gusano ejército.



4. Chizas o Mojoyoy. Larvas de un coleóptero – Cucarrón marceño
(Diversos géneros: *Philophaga*, *Ancognata* etc.



5. (Diversos géneros: *Philophaga*, *Ancognata* etc.





Ideas Biológicas
Por un futuro sostenible

www.ideasbiologicas.com

Email: asesoria@ideasbiologicas.com



[/IdeasBiologicas](https://www.facebook.com/IdeasBiologicas)



[@IdeasBiologicas](https://twitter.com/@IdeasBiologicas)



[ib.ideasbiologicas](https://www.snapchat.com/add/ib.ideasbiologicas)



[301 602 6281](https://wa.me/3016026281)
[310 601 1327](https://wa.me/3106011327)